



مراقبة انتشار اضرار فيروس نقص المناعة البشري بين النساء الحوامل عبر الرصد الوبائي خلال سنة 2011 في موريتانيا

ولد البراءة ، ولد ياسر م. ، منت إبيكر م. ، جيلاني ك. ، كلي م. ، و داد ش. ، م. إبراهيم الكوري
المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، ص ب: 695 انواكشوط ، موريتانيا

الملخص:

في ظل غياب معطيات حول تواتر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين صفوف عموم السكان، يوفر المسح الوبائي المعتمد على منظومة الخفر الوبائي لدي النساء الحوامل قرينة هامة للاستدلال على تواتر الإصابة لدى عموم السكان. في هذا السياق تم القيام بمسح وبائي من اجل تحديد نسبة الإصابة بين صفوف هذه الشريحة على المستوى الوطني. تم اعتماد طريقة الكشف السري، بحيث أغفلت أسماء وهويات المستفيدات حيث تم استبدالها برمز عددي. استخدمت منظومة تتابعية مكونة من اختبارين للكشف المخبري عن الاضرار الموجهة لفيروس نقص المناعة البشري (Determine +Genscreen VIH1/VIH2) ، في حالة تخالف نتيجة الاختبارين، تم اللجوء إلى اختبار (Western Blot) كإثبات.

تمت معالجة 6577 عينة دموية تعود للنساء الحوامل حسب المنظومة السابقة، وأُفرقت النتائج عن ظهور أضرار الفيروس لدى 29 من بينهن أي نسبة إصابة تعادل (0,44%) بمستوى ثقة 95% وحدود ثقة ما بين [0,30 - 0,62] ، تميزت نسبة الإصابة هذه بتلازمها مع تقدم الحوامل في العمر (P=0,0307) ، كما تميزت بتزايدها كلما تعددت مرات الزواج (P=0,0003)

كلمات البحث: نسبة الإصابة - النساء في - تشارة ما قبل الولادة - المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية - موريتانيا